

SUPER CA-40

FICHA TÉCNICA

A. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL PRODUCTO

Calcio orgánico oxidable total	40.0% p/v.
Cao. (Oxido de calcio)	350.0% p/v.
Ácido fólico	0.1% p/v.
Promotores y activadores	2.0% p/v.

B. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DEL PRODUCTO

Apariencia	: Líquido soluble.
Color	: Amarillo.
Olor	: dulce.
pH	: 6.0- 7.0(neutro)
Reactividad	: No reactivo.
Solubilidad	: Soluble en agua.

C. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Recomendado para prevenir y corregir deficiencia de calcio; los que intervienen en muchas funciones bioquímicas (división y elongación de células, germinación de semillas, maduración de frutos), previene la aparición de enfermedades y desórdenes fisiológicos.

En la planta el calcio, interviene en la formación de la celulosa, regula la asimilación del potasio y el magnesio, da dureza y consistencia a los frutos, alarga la vida post cosecha de los frutos y las hortalizas. El boro facilita el transporte de azúcares, actúa sobre el crecimiento meristemático, la formación de flores y frutos y evita el alargamiento, podredumbre y la malformación de frutos.


D. INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

-
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para el ingreso al área tratada durante las 24 primeras horas.
 - Después de usar el producto lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
 - Utilice equipo de protección como: Guantes, mascarilla, mandil, botas y gafas. Utilizar este producto según el cuadro de dosis.



SUPER CA-40

USO DE EQUIPO PERSONAL



E. CUADRO DE DOSIS

CULTIVOS	DOSIS / POR APLICACIÓN / HAS	RECOMENDACIONES
Vid	3.0 – 5.0 L	1º Desarrollo foliar pleno, 2º inicio de floración, 3º crecimiento de baya.
Alcachofa	2.0 – 4.0 L	1º Aplicar al inicio del primer brotamiento, 2º inicio del segundo brotamiento e inducción de capítulos.
Zanahoria, apio	2.0 – 4.0 L	1º Aplic. Plantas con 6 hojas, 2º repetir la aplicación cada 10-15 días.
Zapallo, melón, pepinillo, frijol, arveja, pallar, habas, fresa	2.0 – 4.0 L	1º Aplic. En prefloración, 2º cuajado y llenado de frutos o vainas.
Papa	2.0 – 4.0 L	1º Aplic. Después del aporque, 2º inicio del estoloneo, 3º inicio de fructificación

F. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agregar el producto según la dosis recomendada en el caldo, y luego completar con agua; agitar y proceder a su aplicación.

G. COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas herbicidas, abonos foliares y productos hormonales.



SUPER CA-40

H. PRECAUCIONES EN EL MANEJO Y APLICACIÓN

No, comer, beber y fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. No mezclar con detergente catiónico ni ácidos.

Evitar el contacto directo con ojos y piel. Evite respirar el producto. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

I. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia. En caso de ingestión, inducir al vómito y beber agua o leche.

Si se presenta síntomas o algún malestar, acudir al médico y mostrar la etiqueta del producto

J. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes de este producto.

Preguntas referentes al manejo seguro del producto se deben dirigir a:

Bio Levasa Perú S.A.C.

Av. Terpsícore N 290. Ate. Lima - Lima

Tel: (51) 979 528 655

