

# SUPER CA/B

## FICHA TÉCNICA

### A. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL PRODUCTO

---

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Calcio (CaO)             | 30.0% p/v. |
| Boro (B)                 | 5.0% p/v.  |
| Ácidos Carboxílicos      | 30.0% p/v. |
| Ácido fólico             | 0.1% p/v.  |
| Promotores y activadores | 2.0% p/v.  |

### B. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DEL PRODUCTO

---

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Apariencia  | : Líquido soluble. |
| Color       | : Marrón.          |
| Olor        | : dulce.           |
| pH          | : 4-5 (ácido).     |
| Reactividad | : No reactivo.     |
| Solubilidad | : Soluble en agua. |

### C. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

SUPER CA/B. Recomendado para prevenir y corregir deficiencia de calcio y boro; los que intervienen en muchas funciones bioquímicas (división y elongación de células, germinación de semillas, maduración de frutos), previene la aparición de enfermedades y desórdenes fisiológicos.

En la planta el calcio, interviene en la formación de celulosa, regula la asimilación del potasio y el magnesio, da dureza y consistencia a los frutos, alarga la vida post cosecha de los frutos y las hortalizas. El boro facilita el transporte de azúcares, actúa sobre el crecimiento meristemático, formación de flores y frutos, evita el alargamiento, podredumbre y la malformación de frutos.


### D. INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- 
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para el ingreso al área tratada durante las 24 primeras horas.
  - Después de usar el producto lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
  - Utilice equipo de protección como: Guantes, mascarilla, mandil, botas y gafas. Utilizar este producto según el cuadro de dosis.



# SUPER CA/B

## USO DE EQUIPO PERSONAL



## E. CUADRO DE DOSIS

| CULTIVOS                                                        | DOSIS / Cil (200Lts. Agua) | RECOMENDACIONES                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vid                                                             | 0.25-0.5 L                 | 1º Desarrollo foliar pleno, 2º inicio de floración, 3º crecimiento de baya.                              |
| Alcachofa                                                       | 0.5-1 L                    | 1º Aplicar al inicio del primer brotamiento, 2º inicio del segundo brotamiento e inducción de capítulos. |
| Zanahoria, apio                                                 | 1 L                        | 1º Aplic. Plantas con 6 hojas, 2º repetir la aplicación cada 10-15 días.                                 |
| Zapallo, melón, pepinillo, frijol, arveja, pallar, habas, fresa | 0.5-1 L                    | 1º Aplic. En prefloración, 2º cuajado y llenado de frutos o vainas.                                      |
| Papa                                                            | 0.5-1 L                    | 1º Aplic. Después del aporque, 2º inicio del estoloneo, 3º inicio de fructificación                      |

## F. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agregar el producto según la dosis recomendada en el caldo, y luego completar con agua; agitar y proceder a su aplicación.

## G. COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas herbicidas, abonos foliares y productos hormonales.



# SUPER CA/B

## H. PRECAUCIONES EN EL MANEJO Y APLICACIÓN

---

No, comer, beber y fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. No mezclar con detergente catiónico ni ácidos.

Evitar el contacto directo con ojos y piel. Evite respirar el producto. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## I. PRIMEROS AUXILIOS

---

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia. En caso de ingestión, inducir al vómito y beber agua o leche.

Si se presenta síntomas o algún malestar, acudir al médico y mostrar la etiqueta del producto

## J. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

---

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes de este producto.

Preguntas referentes al manejo seguro del producto se deben dirigir a:

Bio Levasa Perú S.A.C.

Av. Terpsícore N 290. Ate. Lima - Lima

Tel: (51) 979 528 655

